

GYMNASIUM

SCHULAUF

MEHR  
ERFAHREN

# Mathematik 9. Klasse

Bayern

CARLO VÖST

passend  
Lehrplan **PLUS**

**STARK**

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Mit diesem Heft kannst du dich ideal auf die Schul- und Stegreifaufgaben am Gymnasium vorbereiten. Alle Schul- und Stegreifaufgaben richten sich inhaltlich nach dem neuen LehrplanPlus.

Wenn du eine Schulaufgabe oder Stegreifaufgabe gelöst hast, kannst du deine Rechenschritte mit denen im Lösungsheft vergleichen. Damit du deine Leistung auch richtig einschätzen kannst, gibt es in diesem Heft zu jeder Aufgabe weitere Hinweise: Im Angabenteil findest du die Punkte der einzelnen Teilaufgaben und einen Notenschlüssel. Im Lösungsheft ist der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben angegeben und die Zeitangaben verraten dir, wie lange du ungefähr zum Lösen einer Teilaufgabe brauchen darfst. Die Gesamtzeitangabe für jede Schul- und Stegreifaufgabe ist die Summe der Zeitangaben für die einzelnen Aufgaben plus ein paar zusätzliche Minuten für ein abschließendes „Kontrolllesen“.

Viel Erfolg bei deinen Schulaufgaben!

Carlo Vöst

## Inhaltsverzeichnis

Aufgabe	Themenbereiche	Seite
Stegreifaufgabe 1	Quadratwurzeln	1
Stegreifaufgabe 2	Quadratwurzeln, einfache quadratische Gleichungen	2
Stegreifaufgabe 3	Quadratische Funktionen	4
Schulaufgabe 1	Quadratwurzeln, Beweise, quadratische Funktionen	6
Schulaufgabe 2	Quadratwurzeln, Heron-Verfahren, quadratische Funktionen	9
Schulaufgabe 3	Quadratwurzeln, quadratische Funktionen, geometrische Berechnungen	12
Stegreifaufgabe 4	Quadratische Gleichungen	15
Stegreifaufgabe 5	Quadratische Funktionen, quadratische Gleichungen	16
Stegreifaufgabe 6	Lineare Gleichungssysteme	18
Stegreifaufgabe 7	Verknüpfte Wahrscheinlichkeiten	20
Schulaufgabe 4	Quadratische Gleichungen, Bruchgleichungen, Hyperbel, Extremwertprobleme	22
Schulaufgabe 5	Quadratische Gleichungen, lineare Gleichungssysteme, verknüpfte Wahrscheinlichkeiten	26
Schulaufgabe 6	Quadratische Gleichungen, Extremwertprobleme, verknüpfte Wahrscheinlichkeiten	29
Stegreifaufgabe 8	Ähnlichkeit	32
Stegreifaufgabe 9	Strahlensatz	34
Stegreifaufgabe 10	Potenzfunktionen, Rechengesetze für Potenzen	36
Schulaufgabe 7	Ähnlichkeit, Strahlensatz, Rechengesetze für Potenzen	38
Schulaufgabe 8	Ähnlichkeit, Strahlensatz, Potenzfunktionen	41
Stegreifaufgabe 11	Satz des Pythagoras	44
Stegreifaufgabe 12	Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck	46
Schulaufgabe 9	Satz des Pythagoras, Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck, Einheitskreis	48
Schulaufgabe 10	Satz des Pythagoras, Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck, Sinus- und Kosinussatz	51
Schulaufgabe 11	Satz des Pythagoras, Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck, Sinus- und Kosinussatz	54

## Zeichenerklärung

 Zeitangabe    Leichte Aufgabe    Mittelschwere Aufgabe    Schwere Aufgabe






## 6 / Schulaufgabe 1


■ Inhalte: Quadratwurzeln, Beweise, quadratische Funktionen

■ Zeitbedarf: 45 Minuten

1. Erkläre anhand der abgebildeten Skizze, wie man geometrisch plausibel machen kann, dass die Zahl  $\sqrt{2}$  existieren muss. \_\_\_ von 7




2. Beweise, dass die Gleichung  $x^2=2$  in  $\mathbb{Q}$  keine Lösung hat, dass also damit  $\sqrt{2}$  irrational sein muss. \_\_\_ von 10





b) Ermittle rechnerisch die Scheitelkoordinaten und vergleiche diese mit der Zeichnung.

\_\_\_ von 5




c) In der allgemeinen Form der Funktionsgleichung ist hier:  $a=0,3$ ;  $b=1,2$ ;  $c=-1,5$ .

\_\_\_ von 9

Gib jeweils eine Funktion an, die keine Nullstellen hat und


- (1) den gleichen a-Wert und x-Wert des Scheitels,
- (2) den gleichen Scheitel,
- (3) den gleichen y-Achsen-Schnittpunkt hat.



4. Vereinfache folgende Terme so weit wie möglich. Verlangt ist jeweils eine nachvollziehbare, schrittweise Berechnung.


a)  $(5\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{3^3} + 7\sqrt{6})$

\_\_\_ von 5



b)  $\sqrt{\frac{25}{16} + \frac{4}{9}}$

\_\_\_ von 4



#### Notenschlüssel

1	2	3	4	5	6
46-39	38,5-31,5	31-24	23,5-16,5	16-8,5	8-0

So lange habe ich gebraucht: \_\_\_\_\_

So viele Punkte habe ich erreicht: \_\_\_\_\_



## Stegreifaufgabe 3

1. a) ⌚ 2 Minuten, 🧠

$G_f$  ergibt sich aus der Normalparabel ( $y = x^2$ ) durch **Verschiebung um 4 Einheiten nach links** und um **3 Einheiten nach unten**.

- b) ⌚ 2 Minuten, 🧠🧠

Die Nullstellen von  $f$  sind  $x_1 = \sqrt{3} - 4$  und  $x_2 = -\sqrt{3} - 4$ .

*Nebenrechnung:*

$$(x+4)^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow (x+4)^2 = 3 \Leftrightarrow x+4 = \pm\sqrt{3} \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3} - 4$$

- c) ⌚ 1 Minute, 🧠

$G_f$  ist streng monoton steigend in  $]-4; \infty[$  und streng monoton fallend in  $]-\infty; -4[$ .

- d) ⌚ 1 Minute, 🧠

Die Wertemeße der Funktion  $f$  ist  $[-3; \infty[$  (Alternative:  $\{\bar{y} \mid y \geq -3\}$ ).

- e) ⌚ 2 Minuten, 🧠🧠

$G_f$  ist achsensymmetrisch zur **Parallelen zur y-Achse** durch den Punkt  $S(-4 \mid -3)$ .

*Anmerkung:* Es sind sämtliche Punkte  $S(-4 \mid y)$  mit  $y \in \mathbb{R}$  möglich. Wichtig ist  $-4$  als  $x$ -Koordinate.

- f) ⌚ 1 Minute, 🧠🧠

Der Punkt  $P(-1,5 \mid 3,25)$  liegt auf  $G_f$ .

*Nebenrechnung:*

$$f(-1,5) = (-1,5 + 4)^2 - 3 = 2,5^2 - 3 = 3,25$$

- g) ⌚ 3 Minuten, 🧠🧠

Der Graph der Funktion  $g$ , gegeben durch  $g: x \mapsto x^2 - 8x + 17$ ,  $x \in \mathbb{R}$ , geht aus  $G_f$  hervor durch **Verschiebung um 8 Einheiten nach rechts** und **um 4 Einheiten nach oben**.

*Nebenrechnung:*

$$x^2 - 8x + 17 = x^2 - 8x + 16 - 16 + 17 = (x - 4)^2 + 1$$

2. a) ⌚ 4 Minuten, 🧠🧠

$$S(-2 \mid 6) \in G_f: f(x) = a \cdot (x+2)^2 + 6$$

$$S_y(0 \mid 5) \in G_f: 5 = a \cdot (0+2)^2 + 6 \Leftrightarrow 4a = -1 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{4}$$

4 

$$\begin{aligned}f(x) &= -\frac{1}{4}(x+2)^2 + 6 = -\frac{1}{4}(x^2 + 4x + 4) + 6 \\ &= -\frac{1}{4}x^2 - x - 1 + 6 = -\frac{1}{4}x^2 - x + 5\end{aligned}$$

b) ⌚ 3 Minuten,  

Nullstellen:

$$f(x) = -\frac{1}{4}(x+2)^2 + 6 = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{4}(x+2)^2 = -6 \Leftrightarrow (x+2)^2 = 24$$

$$x+2 = \pm\sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6}$$

$$x_1 = 2\sqrt{6} - 2; \quad x_2 = -2\sqrt{6} - 2$$


# Schulaufgabe 1

1. ⌚ 6 Minuten, 🌀🌀🌀

Wenn man aus der Diagonale des Quadrates mit der Seitenlänge 1 (grau) ein neues Quadrat (gepunktet) bildet, dann hat dieses den doppelten Flächeninhalt des grauen Quadrates, also  $2 \cdot 1 = 2$ , weil es aus vier halben grauen Quadraten besteht.

Demnach muss das gepunktete Quadrat eine Seite mit einer Länge, deren Wert im Quadrat 2 ergibt, haben.

Damit ist geometrisch plausibel gemacht, dass es eine Zahl wie  $\sqrt{2}$  geben muss.



2. ⌚ 10 Minuten, 🌀🌀🌀🌀

Behauptung: Die Gleichung  $x^2 = 2$  hat in  $\mathbb{Q}$  keine Lösung.

Beweis

Annahme: Es gibt eine rationale Zahl  $\frac{p}{q}$ , die quadriert 2 ergibt.

Also:  $\left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$ , wobei  $\frac{p}{q}$  vollständig gekürzt ist.

$\Leftrightarrow p^2 = 2 \cdot q^2 \Rightarrow p^2$  ist durch 2 teilbar.  $\Rightarrow p$  ist durch 2 teilbar (gerade).

Wäre  $p$  nicht durch 2 teilbar, dann müsste es zwingend ungerade sein. Das Quadrat einer ungeraden Zahl ist aber wieder stets ungerade, sodass ein Widerspruch zu „ $p^2 = \text{gerade}$ “ entstünde.

$p = 2 \cdot k$  eingesetzt in die Ausgangsgleichung folgt:

$4k^2 = 2q^2 \Rightarrow 2k^2 = q^2 \Rightarrow q^2$  ist durch 2 teilbar  $\Rightarrow q$  ist durch 2 teilbar.

Dies kann aber nicht sein, da nicht  $p$  und  $q$  durch 2 teilbar sein können, dann könnte man ja wieder entsprechend kürzen. Also muss die Annahme falsch gewesen sein und keine rationale Zahl ergibt quadriert 2, also ist  $\sqrt{2}$  irrational.

3. a) ⌚ 6 Minuten, 🌀🌀🌀

Abgelesene Achsenschnittpunkte:  $N_1(-5|0)$ ,  $N_2(1|0)$ ,  $S_y(0|-1,5)$

Nullstellenform von  $f(x)$ :

$$f(x) = a \cdot (x - (-5)) \cdot (x - 1) = a \cdot (x + 5) \cdot (x - 1)$$

$$S_y \in G_f : f(0) = -1,5 \Leftrightarrow a \cdot 5 \cdot (-1) = -1,5 \Leftrightarrow a = 0,3$$

Es folgt:

$$f(x) = 0,3 \cdot (x + 5)(x - 1) \text{ (Nullstellenform)}$$

$$f(x) = 0,3 \cdot (x^2 - x + 5x - 5) = 0,3x^2 + 1,2x - 1,5 \text{ (allgemeine Form)}$$

b) ⌚ 4 Minuten, 

$$\begin{aligned}
 0,3x^2 + 1,2x - 1,5 &= 0,3 \cdot [x^2 + 4x - 5] \\
 &= 0,3 \cdot [x^2 + 4x + 4 - 4 - 5] \\
 &= 0,3 \cdot [(x + 2)^2 - 9] \\
 &= 0,3 \cdot (x + 2)^2 - 2,7
 \end{aligned}$$

Also ist der Scheitel  $S(-2 | -2,7)$ . Das stimmt mit der Zeichnung überein.

c) ⌚ 8 Minuten,   

- (1) z. B.:  $g(x) = 0,3 \cdot (x + 2)^2 + 1$  ( $= 0,3x^2 + 1,2x + 2,2$ )  
Die Parabel ist nach oben geöffnet und der Scheitel hat eine positive y-Koordinate.
- (2) z. B.:  $h(x) = -0,3(x + 2)^2 - 2,7$  ( $= -0,3x^2 - 1,2x - 3,9$ )  
Die Parabel ist nach unten geöffnet und der Scheitel hat eine negative y-Koordinate.
- (3) z. B.:  $i(x) = -x^2 + x - 1,5 = -[x^2 - x + 0,25 + 1,25] = -(x - 0,5)^2 - 1,25$   
Die Parabel ist nach unten geöffnet und der Scheitel hat eine negative y-Koordinate.

*Hinweis:* Es genügt jeweils die Angabe einer Gleichung (egal welche Form) ohne Erklärung.

4. a) ⌚ 5 Minuten, 

$$\begin{aligned}
 (5\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(\sqrt{3^3} + 7\sqrt{6}) &= (5\sqrt{6} - 2\sqrt{3})(3\sqrt{3} + 7\sqrt{6}) \\
 &= 15\sqrt{18} + 35\sqrt{36} - 6\sqrt{9} - 14\sqrt{18} \\
 &= 15\sqrt{18} + 210 - 18 - 14\sqrt{18} \\
 &= \sqrt{18} + 192 = 3\sqrt{2} + 192 = 3(\sqrt{2} + 64)
 \end{aligned}$$

b) ⌚ 3 Minuten,  

$$\sqrt{\frac{25}{16} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{225 + 64}{144}} = \sqrt{\frac{289}{144}} = \frac{17}{12}$$



© **STARK Verlag**

[www.stark-verlag.de](http://www.stark-verlag.de)  
[info@stark-verlag.de](mailto:info@stark-verlag.de)

Der Datenbestand der STARK Verlag GmbH ist urheberrechtlich international geschützt. Kein Teil dieser Daten darf ohne Zustimmung des Rechteinhabers in irgendeiner Form verwertet werden.

**STARK**